

Teljes körű Botox kezelés Nyíregyházán

Botox® (Vistabel®) a mimikai ráncok eltüntetésére



Az évek múlásával a homlokon, a szemöldökök között, a szemkörnyéken egyre mélyülő ráncok alakulhatnak ki, melyeket mimikai

ránckoknak nevezünk. Kialakulásukért az arcizmok erőteljes működése tehető felelőssé.

A Botox® (Vistabel®) az Allergan cég által gyártott terápiás izomlazító szer, melyet a **Clostridium botulinum** nevű baktériumból nyernek ki.

Ez az anyag évtizedes tapasztalatokkal bizonyos ideggyógyászati betegségekre nyújtott már eddig is megoldást, az utóbbi években pedig leggyakoribb felhasználási területe az esztétikai bőrgyógyászat lett. Ma a Botox ránctalanítás a világon a legtöbbet végzett szépségügyi beavatkozás.

Hogyan működik a Botox® (Vistabel®)?



A kezelést megelőző orvosi vizsgálat során a páciens adatainak és igényeinek figyelembe vételével a részletes anatómiai ismeretekkel

rendelkező kezelőorvos előre gondosan megválasztja a szűrési pontokat és a szer ideális dózisát. A kezelés során egy ultra vékony tűvel bizonyos pontokon, meghatározott mennyiségű hatóanyagot adunk a bőr alá, a ráncokért felelős izmokba.

A Botox injekció a beadás helyén megakadályozza az ideg – izom ingerület áttevődést, ennek révén csökkenti a mimikai izmok összehúzódását, így a felettük kialakult ráncok elsimulnak. Az európai kultúrának megfelelően

végzett beavatkozás az izmokat nem teszi teljesen me-revvé, csak relaxálja, ennek megfelelően nem tűnik el teljesen az arc mimikája, érzelmkifejező képessége, csupán simábbá, kipihentebbé válik a bőrfelszín.

A kezelés hatékony, biztonságos, és körülbelül 15 percig tart. Minimális tűszúrásai fájdalommal jár csupán, érzéstelenítésre nincs szükség.

Mennyi ideig tart a Botox® (Vistabel®) kezelés hatása?

A hatás általában 4-6 hónapig tart és fokozatosan csökken. Több botox kezelést követően az eredmények 4-8 hónapig vagy tovább is tartanak. Az injekciós kezelés évente többször biztonsággal ismételhető, a leggyakrabban évente 2 alkalommal kéri a páciensek.

Mellékhatásai a Botox® (Vistabel®) kezelésnek, ha vannak is, általában enyhék és átmeneti jellegűek. Ideiglenes apró bevérzés néha tapasztalható, de ez a tünet eltűnik 2-3 nap alatt, addig is sminkkel fedhető. Ritka esetekben előfordulhat a szemhéj lógása vagy aszimmetria az orcákon, de ez ideiglenes csak, teljes mértékben megszűnik. Képzett szakorvos által végzett beavatkozáson esélye minimálisra csökken.

A ránctalanító Botox® (Vistabel®) kezelés pozitív hozadékaként nagyon sok páciens arról számol be, hogy korábbi migrénes panaszai jelentősen csökkentek, vagy teljesen megszűntek.

Milyen eredményeket láthatunk?

A Botox® (Vistabel®) hatása jellemzően már 3-5 napon belül látható. A végleges eredmény 1-2 hét után alakul ki. Amint a korlátozott izomműködés révén elsimul a bőr, az arc nyugodtabb, kipihentebb és fiatalosabb megjelenést mutat. Kisebb arci aszimmetriát is eltüntethetünk Botox® (Vistabel®) kezeléssel.

A kezelést gyakran együtt használjuk más eljárásokkal, mint a lézeres bőrfiatalítás és az injekciós ránc- és ajakfeltöltő kezelések. A páciens számára legelőnyösebb kezelési kombinációra az előzetes vizsgálat alapján a szakorvos tesz javaslatot.



Dr. Belezny Gyöngyike

Bőrgyógyász - kozmetológus szakorvos
lézenterapeuta magánorvos.
Derma-Art Bőrgyógyászati Magánklinika
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 60.
Telefon: +36 42 506091, +36 30 5540848
Fax: +36 42 506092
E-mail: drbelezny@dermaart.hu
E-mail: office@dermaart.hu
Web: www.dermaart.hu

Zavaró mértékű verejtékezés megszüntetése Botox® (Vistabel®) kezeléssel.

A fokozott hónalji verejtékezés kezelése korábban megoldatlan probléma volt. A külsőleg alkalmazható dezodorok, oldatok, hintőporok csak az átlagos mértékű izzadást képesek csökkenteni, az ettől erősebb verejtékezést nem befolyásolják kielégítő mértékben.

Kinek javasolható a hónalji izzadás Botox® (Vistabel®) kezelése?

Akinél kizárhatóak azok a belgyógyászati betegségek (pl. pajzsmirigy túlműködés), amelyek kiválthatnak extrém mértékű izzadást.

Akinek a külsőleg alkalmazott izzadás gátlók nem használnak.

Aki naponta többször kénytelen ruhát cserélni a zavaró nedves foltok vagy nemkívánatos illatok miatt.

Akit a mindennapi életvitelben bármilyen szempontból zavar nagymértékű izzadása.

Hogyan zajlik a fokozott izzadás Botox® (Vistabel®) kezelése?

A botox kezelés előtt speciális jódpróba elvégzésével pontosan körülhatárolható a kezelendő terület. A beavatkozás kb. fél 30 percet vesz igénybe, és a páciens utána azonnal visszatérhet további napi teendőihez.

A hatás átlagos esetben 1-4 héten belül jelentkezik, az izzadás mértéke 80-90%-kal csökken.

A szer hatása 5-8 hónapig áll fenn, a verejtékezés fokozatosan tér vissza. A legtöbb páciens évente 1-2 alkalommal él az ismétlődő kezelés lehetőségével.

A fokozott verejtékezés Botox® (Vistabel®) kezelését leggyakrabban hónaljban alkalmazzuk, de a tenyéri és talpi erőteljes izzadás megszüntetésére is használható.



Dr. Belezny Gyöngyike

Bőrgyógyász - kozmetológus szakorvos
lézertapeuta magánorvos.
Derma-Art Bőrgyógyászati Magánklinika
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 60.
Telefon: +36 42 506091, +36 30 5540848
Fax: +36 42 506092
E-mail: drbelezny@dermaart.hu
E-mail: office@dermaart.hu
Web: www.dermaart.hu